

# À la découverte des Araignées

Alain Canard  
Christine Rollard



Araignées de nos régions, sachez les reconnaître



Un guide de terrain pour comprendre la nature

**DUNOD**



جامعة أمحمد بوقرة - بومرداس  
Université M'hamed Bougara - Boumerdes

المكتبة الجامعية

رقم الجرد: 0116192



# À la découverte des araignées

Alain Canard  
Christine Rollard



جامعة أمحمد بوقرة - بومرداس

Université M'hamed Bougara - Boumerdes

المكتبة الجامعية

رقم الجرد: 638.5/CAN

DUNOD





# Sommaire

Mode d'emploi .....	4
<b>À la découverte des araignées</b> .....	<b>7</b>
Des araignées et des hommes .....	8
Qu'est-ce qu'une araignée ? .....	11
Le monde des araignées .....	38
Observer les araignées .....	54
Comment distinguer les principales araignées ? .....	62
Clé visuelle d'identification .....	64
<b>Reconnaître les araignées</b> .....	<b>71</b>
■ Araignées errantes .....	72
■ Araignées à toiles .....	119
Carnet pratique .....	171
Glossaire .....	175
Index général .....	179
Index des espèces .....	180
Remerciements .....	185
Crédits .....	187

une  
et de  
pour  
vres  
cor-  
pée.  
toute  
stale,  
n est  
de  
u du  
n du  
des

l'article  
tement  
ctive »  
mple et  
e faite  
ise est

nstitués  
nts du

# À la découverte des Araignées



Pourquoi trouve-t-on des araignées dans les baignoires ?  
D'où vient le nom de la Tarentule ?

## Un guide de terrain

Des explications scientifiques pour découvrir le monde des araignées.

## Araignés, sachez les reconnaître

Les espèces les plus courantes

Où les observer ?

Des anecdotes pour mieux les connaître

**Trochosa terrassière**  
*Trochosa terrassière*

110

**Caractères distinctifs, espèces**  
L'espèce la plus commune est celle de toutes les araignées à toile (les orbicides). La trochossière, avec de longues bandes latérales et une bande médiane plus claire dirigée dans la même direction, est caractéristique du genre Trochosa. Il existe, en France métropolitaine, cinq espèces dans le genre, précédées des homologues et des analogues d'ailleurs. Si les mâles peuvent être assez facilement identifiés par l'examen de leur céphalote ou de leurs bulbes copulateurs, les femelles nécessitent pour certaines de comparer les différentes dimensions des céphalotes.

**Types de céphalotes**  
Céphalote et céphalote ou tel ou tel autre sans à développement femelle, en général avec chélicères, bulbes, dents, chélicères et bulbes de toile.

**Chasse**  
La chasse est effectuée par sautoirs et chasses puis capture directe. La période d'activité de chasse est variable selon les climats. Le cycle, les jours sont chauds, les femelles copulatoires et de début de nuit.

**Développement, cycle**  
Les femelles sont présentes toute l'année, les mâles émergent en fin d'été. Le cycle vital atteint souvent deux, parfois trois ans. Les mâles ont une activité de recherche sexuelle d'été. Il y a aussi deux périodes annuelles de pontes. L'une au printemps, l'autre en automne.

Famille  
Laciniidae

**Terrassière ?**  
La trochossière est la plus grande araignée d'Europe. Elle est commune dans les jardins, les champs, les forêts, les bords de rivières, les bords de mer et les bords de lacs. Elle est présente dans toute la France. Elle est présente dans toute la France. Elle est présente dans toute la France.

## Prolongez la découverte

De nombreuses adresses pour aller plus loin.



9 782100 711048

8855546

ISBN 978-2-10-071104-8



Muséum  
national  
d'Histoire  
naturelle

14,90 € Prix France TTC

DUNOD  
dunod.com